

التطعيم ضد كوفيد-19 - إجابات على الأسئلة المتداولة

1 ما هي اللقاحات المرخصة والمتاحة للتلقيح؟

لقاحات كوفيد-19 التي تم ترخيصها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) هي: فايزر /بيونتيك و استرا زانিকা و موديرنا و جونسون جونسون

2 ما هي الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من كل لقاح؟

فايزر /بيونتيك : يتم إعطاء لقاح فايزر /بيونتيك على جرعتين ،

بفاصل 3 أسابيع بين الجرعتين

استرا زانিকা: لقاح استرا زانিকা يعطى على جرعتين ، مع

فترة 8 أسابيع بين الجرعتين

موديرنا: لقاح موديرنا على جرعتين بفاصل زمني

فترة 28 يومًا بين الجرعتين

جونسون جونسون: يتم إعطاء لقاح جونسون جونسون في نطاق أ

جرعة واحدة ومن يحصل عليها يكمل تطعيمه

3 كيف يمكنني تأكيد مواعيدي إذا لم أتلق رسالة نصية أو لم يتم إرسال الشهادة ذات الصلة؟

في هذه الحالة ، يمكن للمواطنين الاتصال بمركز الاتصال 1474

4 كيف يمكنني ترتيب موعد آخر بخلاف الإجراء الذي تم إجراؤه من خلال بوابة التطعيم؟

بالإضافة إلى ترتيب المواعيد عبر بوابة التطعيمات للمواطنين

يمكنهم الاتصال بطبيبهم الشخصي ، بشرط أن يكون الطبيب قد أبدى اهتماماً بـ

تطعيم المستفيدين من سن 30 وما فوق في عيادته مع

لقاح استرا زانিকা. في هذه الحالة ، سيتمكن المواطنون من ترتيب موعد

التطعيم من خلال طبيبهم الشخصي ، في اليوم والوقت الذي يحدده الطبيب

5 إذا لم أكن مسجلاً أو مستفيداً من برنامج الصحة ، كيف يمكنني ترتيب موعد؟

المواطنين الغير مسجلين في برنامج الصحة GHS او الغير المستفيدين من برنامج الصحة GHS

ويرغبون في الحصول على اللقاح في إطار خطة التطعيم الوطنية

ضد كوفيد-19 يجب استكمال الوثيقة وتقديمها إلى وزارة الصحة

لتسجيل المواطنين غير المستفيدين من برنامج الصحة في قبرص

بوابة التطعيمات كوفيد-19. يجب تقديم طلب مع نسخة من

بطاقة هوية الطرف المهتم أو بطاقة تسجيل الأجانب (دفتر الالين) أو اي اوراق تثبوتية
بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الطبية ، إن أمكن . كل المستندات يجب ارسالها الى وزارة الصحة عبر البريد الالكتروني

covidvac@moh.gov.cy

أو عن طريق البريد العنوان التالي:
1 Prodromou and 17 Chilonos, 1449 Lefkosia,
أو تسليمها بل اليد الى إدارة البطاقة الطبية بوزارة الصحة
, 1 Prodromou and 17
Chilonos, Lefkosia

6 هل يجب تأجيل التطعيم الخاص بي إذا كنت مصابا بفيروس كورونا أو على وشك الانتهاء الاتصال بحالة إيجابية؟

نعم ، في الحالتين يجب تأجيل التطعيم
المواطنون الذين لديهم موعد محدد ولكن في هذه الأثناء تم تشخيصهم على أنهم
من ضمن الحالات الإيجابية لفيروس كورونا أو التي تم الإبلاغ عنها على أنها جهات اتصال وثيقة لحالة إيجابية
طلب إعادة جدولة مواعدهم ، حسب الإجراء
الموصوفة في السؤال 5

7 هل أحتاج إلى تحديد مواعيدي عند فتح بوابة التطعيم ، حتى لو كنت مصابا بفيروس كورونا أو كنت على اتصال وثيق؟

نعم ، بغض النظر عما إذا كان المواطن مصابا بالفيروس أو مخالطا وثيقا هو / هي
يجب أن يرتب مواعده عندما تكون بوابة التطعيم متاحة له / لها
الفئة العمرية.

8 ثم كيف يمكنني إعادة تحديد مواعيدي إذا كنت مصابا بفيروس كورونا حالة أو اتصال وثيق بحالة إيجابية؟

في البداية يتضح أنه في حالة إعادة الجدولة يتم منح المواطن بطاقة جديدة
التعيين في نفس مركز التطعيم ونفس نوع التطعيم
مواعده / مواعدها الأولى ، في أقرب وقت ممكن.
من أجل إعادة تحديد الموعد ، من الضروري إبلاغ وزارة الصحة
فورا. يمكن للمواطن الاتصال بمركز الاتصال 1474
عندها يسوف يطلب منك تقديم تفاصيل الموعد وسبب طلبه
الإلغاء ، ايضا ممكن تغيير التاريخ ، أو إرسال بريد إلكتروني إلى
director@mphs.moh.gov.cy

تسجيل المعلومات التالية:

الاسم و الكنية

رقم الهوية

تاريخ الميلاد

التاريخ و وقت الموعد

ما إذا كانت إعادة الجدولة تتعلق بالجرعة الأولى أو الثانية

مركز التطعيمات

نوع اللقاح

رقم الهاتف

سبب طلب إعادة الجدولة (على سبيل المثال ، حالة إصابة بفيروس كورونا ، إغلاق

الاتصال بحالة إيجابية ، إلخ)

التاريخ المفضل للموعد الجديد

بعد تلقي المعلومات أعلاه والتحقق منها من قبل وزارة الصحة ، فإن

سيتم إعادة تحديد الموعد وإبلاغ المواطن وفقاً لذلك

المواطن لا يحتاج إلى اتخاذ أي إجراء آخر من خلال بوابة التطعيم

9 هل يمكن للمواطن طلب موعد جديد مع نوع اللقاح اخر، إذا كان لا يريد إعادة تحديد مواعده؟

نعم ، يمكن القيام بذلك بعد إلغاء الموعد الحالي بالاتصال على 1474

مركز الاتصالات. بعد ذلك ، سيتمكن المواطن من طلب موعد جديد من خلال

بوابة التطعيم عندما تكون متاحة لفئته العمرية

بوابة التطعيمات متاحة يوميا لمختلف الفئات العمرية والمواطنين

المهتمين بالتطعيم يجب تحديد مواعدهم في أسرع وقت ممكن ، لذلك

أنه يمكن تطعيمهم بسرعة ، وبالتالي حماية صحتهم

10 متى يتم التطعيم بعد المرض من كوفيد-19؟

يتم التطعيم في غضون ثلاثة (3) أشهر بعد الشفاء وبعد انتهاء 42 يوم على الأقل بعد الشفاء أو اختبار التشخيص المصلي

11 متى يتم التطعيم للأشخاص المخالطين لحالة إيجابية؟

في حالات الاتصال الوثيق ، يمكن إجراء التطعيم بعد انتهاء فترة العزل الذاتي. في حال أصبح الاتصال الوثيق حالة إيجابية ، يتم إجراء التطعيم في

غضون ثلاثة (3) أشهر بعد الشفاء ، وبعد 42 يوماً على الأقل

انقضت بعد الشفاء / اختبار التشخيص المصلي

12 ما هي نسبة الحماية بعد كل جرعة من كل لقاح؟

فايزو بيونتيك: تقدم مناعة بنسبة 52% بعد سبعة أيام من الجرعة الأولى ، مع

ارتفعت النسبة إلى 89% بعد أسبوع آخر. حسب آخر البيانات

من شركة فايزر ، بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية ، تصل الفعالية إلى 91.3%

ضد المرض الخفيف من كوفيد-19 و 95.3% ضد المرض الشديد

استرا زانوكا: يضمن مناعة 70% بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى

بعد 15 يومًا من الجرعة الثانية ، تكون الحماية من 76% إلى 94% من كوفيد-19 وهو

حقق. إنه فعال 100% في الوقاية من الأمراض الخطيرة و

العلاج في المستشفيات

موديرنا: تصل الفعالية إلى 92% بعد 14 يوما من الجرعة الأولى ، بينما تصل الفعالية بعد 14 يوما من الجرعة الثانية إلى 94.1% ، أما بعد ستة (6) أشهر من الجرعة الثانية ، فإن الحماية تصل إلى 90% من الأمراض الخفيفة. من كوفيد-19 وبنسبة 95% ضد المرض الشديد

جونسون جونسون: الحماية تبدأ بعد 14 يوما ، وبعد 28 يوما تصل فعاليتها ضد الآثار الشديدة لفيروس كوفيد-19 إلى 85%. بعد 49 يوما ، ثبت أن اللقاح يمنع تماما تقريبا دخول المستشفى وخطر الوفاة.

27.04.2021